

附件

福建省工伤职工停工留薪期分类目录

(一) 外 伤

骨 科、普外、神经外科

外伤疾病名称	停工留薪期	医疗终结评定依据	备 注
骨盆骨折			
不影响骨盆环的稳定性骨折	3 个月	X 光片证实骨折已愈合。	
骨盆前半环骨折	3—5 个月	同上	
骨盆后半环骨折或骶髂关节半脱位	4—6 个月	同上	
骶骨骨折、伴骶神经损伤。	4—6 个月	骨折临床愈合	神经损伤参照神经外科处理
骨盆前后半环同时骨折	4—6 个月	X 光片证实完全或基本复位，骨折愈合。	
合并尿道或膀胱或直肠损伤	4—6 个月	大小便顺畅	尿道狭窄，尿痿需二期手术或结肠造瘘手术后须二期手术者，延长停工留薪期。
腰背软组织损伤			
腰背挫、扭伤	1—2 个月	局部肿胀消退、脊柱活动功能良好。	
腰椎间盘突出症或梨状肌综合症	3—5 个月	无明显神经根激惹或受压症状脊柱活动功能较为良好。	
四肢损伤			
软组织损伤	1 个月	创口愈合，血肿吸收、功能良好。	
皮肤缺损	1 个月—2 个月	创面愈合。	如需二次修整形手术延长停工留薪期。
关节损伤			
附属结构损伤	3—5 个月	关节肿胀消退，积液吸收，关节活动功能无明显受限，无关节交锁症状。	
脱位（上下肢）	3—5 个月	除上项外，脱位已完全或基本复位	脱位伴神经损伤，可比照神经损伤处理。
累及大关节面的骨折	6—9 个月	关节肿胀消退，积液吸	1、伴神经损伤，可比

		收, 关节活动无明显受限, 无关节交锁症状。	照神经损伤处理 2、严重创伤关节炎或关节粘连, 则延长停工留薪期。
四肢损伤			
长管状骨折其他骨折			
肱骨折	4—6个月	创口愈合, 临床检查及X光所见, 骨折愈合良好, 对位或对线良好, 关节活动达到功能范围。	骨折合并神经损伤, 按周围神经损伤处理。骨折畸形连接, 迟延连接或不连接, 股骨头缺血性坏死者, 需二次手术治疗时, 延长停工留薪期。如需再一次手术取内固定物者, 该次手术另加治疗时间1—3个月。
尺桡骨骨折	4—6个月		
尺桡骨双折	4—6个月		
股骨折	6—10个月		
胫骨折	6—10个月		
腓骨折	3个月		
胫腓骨双折	6—10个月		
内、外踝单折	4—5个月		
双踝或三踝骨折	6—8个月		
跖骨折	3—5个月	以单个或多个跖骨骨折考虑期限	以单个或多个跖骨骨折考虑期限, 多发性骨折, 按最严重的骨折部分的标准适当延长停工留薪期。
股骨颈(包括粗隆间)骨折	9—12个月		
跟、距骨折	4—6个月		
跗骨折	3—5个月		
趾骨折	2—4个月		
腓骨折	4—6个月		
指骨折	2—4个月		
掌骨折	2—4个月		
腕骨折	3—6个月		
手肌腱损伤	1—3个月	伸屈功能较为良好。	如需二期肌腱移植, 延长停工留薪期。
跟腱断裂	3—6个月	伸屈功能较为良好。	如需二期手术治疗, 延长停工留薪期。
膝关节韧带断裂	3—6个月	伸屈功能较为良好。	如合并半月板、交叉韧带损伤或需二期手术治疗, 延长停工留薪期。最长延长不超3个月
脊柱损伤			
脊椎骨折			
压缩骨折	3—6个月	脊柱活动功能恢复良好。	如合并神经损伤需进一步治疗者延长停工留薪期。
横突骨折	2—3个月	脱位整复或大部分整复, 功能恢复。	
关节突骨折	3—6个月	症状、体征稳定。	
棘突骨折	2—3个月	症状、体征稳定。	
椎板骨折(腰4以上)	3—6个月	症状、体征稳定。	如需进行脊柱融合手

骨折脱位	3—6个月		术延长停工留薪期（<3个月）。
骨折伴脊髓损伤	6—12个月		
骨折伴马尾损伤	6—12个月		
骶骨骨折、尾骨骨折	3—6个月		同上。
外伤性肢体离断残端修复			
拇指离断	1—2个月		如进行断指（趾）、肢再植或遗有残端痛需手术治疗、上肢安装义肢后应增加3个月恢复期，下肢安装义肢后应增加适应锻炼时间4个月。
食指离断	1—2个月		
其它各指离断	1—2个月		
足各趾、趾离断	1—3个月		
其它各肢体离断	3—5个月		
肢体离断再植	3—6个月		
周围神经损伤			
臂丛神经损伤	6—12个月	感觉、运动功能稳定。	期限长短按神经损伤程度及功能损失程度确定（以肌电图检查如部分或完全性损害）
尺神经干损伤	6—12个月		神经移植术，或神经瘤、神经萎缩、神经粘连等需行二期手术，或肌腱移位术、关节融合手术等，延长停工留薪期。
正中神经干损伤	6—12个月		
桡神经干损伤	6—12个月		
胫神经干损伤	6—12个月		
腓总神经干及其主要分支的损伤	6—12个月		
坐骨神经干损伤	6—12个月		
股神经干损伤	6—12个月		
头皮、颅脑损伤			
单纯头皮挫裂伤	2周一1个月	创口愈合。	如有伤口感染，延长停工留薪期（<1个月）。
头皮下、骨膜下或帽状腱膜下血肿	2周一1个月	创口愈合，血肿吸收。	如需手术，可延长停工留薪期（<1个月）。
头皮撕脱、缺损	3—4个月	创口愈合。	如需延期植皮，延长停工留薪期（<1个月）。
颅骨骨折			
单纯颅盖部线形骨折	1个月	创口愈合，血肿吸收，X光片可遗有骨折线或轻微凹陷。	1、如需延期补颅骨，延长停工留薪期。
颅盖凹陷粉碎骨折	非手术：1个月 手术：3—4个月		2、遗有脑脊液漏和面神经损伤需手术者，延长停工留薪期。
颅底骨折	2—4个月		
脑震荡	1—2个月	神志清楚，无神经系统异常体征。	如有其他并发症可适当延长停工留薪期。
脑挫裂伤	3—6个月	颅压正常，生命体征稳	

颅内血肿	3—12个月	定。 同上。	按血肿大小、是否手术以及术后情况确定期限。
脑干损伤	12个月	生命体征稳定。	评定为植物人时应列为停工留薪期满。
脊髓损伤	12个月	症状、体征稳定。	如需进一步治疗，延长停工留薪期。
马尾损伤	12个月	同上。	
胸部损伤			
胸壁外伤(开放、闭合)	1个月—2个月	创口愈合，血肿吸收。	遗留有窦道，适当延长停工留薪期。
肋骨骨折(单条)	2—3个月	X光片示骨折愈合，皮下血、气肿吸收。	
肋骨骨折(多条)	3—5个月	同上。	
血、气胸	3—6个月	血、气基本吸收，肺功能良好。	如合并脓胸延长停工留薪期。
食道损伤	3—6个月	创口愈合，能进半流饮食。	如需作食道重建术或其他治疗者，延长停工留薪期。
锁骨骨折	3—5个月	创口愈合，血肿吸收。	如合并感染，延长停工留薪期。
腹部损伤			
单纯腹壁损伤(开放、闭合)	2周—2个月		不包括实质性器官损伤和骨盆损伤。
腹膜后间隙损伤	1—4个月	血肿吸收。	按血肿大小及是否手术确定期限。如合并胰、尿瘘需延长停工留薪期，需经专家认定。
实质性器官损伤(肝、脾、肾、胰等)	2—6个月	创口愈合，无腹膜刺激症状。	如遗留胃、肠、胆瘘需延长停工留薪期，需经专家认定。
空腔器官损伤(胃、肠、胆囊等)	2—6个月	同上。	

注：各类型腹部损伤合并感染，停工留薪期视具体情况适当延长。

烧 伤 科

外伤疾病名称	停工留薪期	医疗终结评定依据	备注
手部、四肢大关节	6个月	创面愈合。	如需整形手术则延长停工留薪期。
头颈部或会阴部烧伤	8个月		
烧伤 50-70%	6个月	创面愈合。	需多次整形手术者，延长停工留薪期。
烧伤 70-100%	8个月		

眼 科

外伤疾病名称	停工留薪期	医疗终结评定依据	备注
眼睑损伤			
皮下出血 皮下气肿	1 周一 1 个月	出血、气肿基本吸收。	
单纯皮肤损伤	1—3 周	创口愈合。	
眼睑全层断裂(包括眼睑损伤)	1—3 个月	创口愈合。	需整形、植皮术延长停工留薪期。
合并提上睑肌损伤(上睑下垂)	3—6 个月	提上睑肌功能基本恢复,或开睑功能不能治愈,而损伤已临床痊愈。	需二次手术, 延长停工留薪期。
合并泪小管、泪囊、泪腺损伤	3—6 个月	创口愈合。	同上。
眼睑灼伤	2—4 个月	灼伤愈合。	需整形手术, 延长停工留薪期。
眼眶损伤			
眼眶骨折(开放、闭合)	2—4 个月	创口愈合, 骨折愈合。	合并颅脑损伤, 按颅脑损伤处理。
眶内异物	3—6 个月	创口愈合, 异物摘除, 或异物不能摘除而创口愈合, 眶内并发症已愈合或被控制。	如有异物伤及视神经、眼球、副鼻窦等, 按并发症处理。
眼球突出	3—6 个月	眼球基本复位, 或突出不能复位而损伤已临床治愈。	
眼球陷入	3—6 个月	基本恢复正常, 或眼球陷入不能复位而损伤已临床治愈。	合并眶骨骨折, 按眶骨骨折处理。
眼肌损伤	6—9 个月	眼肌损伤已临床治愈, 复视症状已恢复正常, 或遗有斜视、复视。	需二次手术者, 延长停工留薪期。
结膜损伤			
结膜异物	2 周一 1 个月	异物除去, 创口愈合, 或遗有散在细小异物, 不能摘除。	
结膜下出血、结膜裂伤	2 周一 1 个月	创口愈合, 出血基本吸收。	
外伤性结膜炎	1—2 个月	结膜炎症消退。	
化学伤、烧伤、灼伤	3—6 个月	创口愈合。	按烧伤程度确定期限。如果遗留眼球粘连需手术者, 延长停工留薪期。
角、巩膜损伤			
角膜异物	1—3 个月	异物除去, 创口愈合或角	

角膜擦伤 角、巩膜穿孔 合并白内障	2周—1个月 1—3个月 6—9个月	膜上皮留有散在细小异物，不能摘除。 创口愈合。 创口愈合。 创口愈合，白内障摘除，或白内障尚不宜摘除而创口已愈合。	合并其他损伤的按重的损伤确定期限
合并眼内异物	6—9个月	创口愈合，异物摘除，或异物不能摘除而创口愈合。	合并铁锈症、铜锈症，延长停工留薪期。
合并慢性色素膜炎	6—12个月	创口愈合，炎症消退或基本被控制。	炎症复发，延长停工留薪期。
化学伤、烧伤、烫伤	3—9个月	结膜充血消退，角膜上皮愈合。	波及房角继发青光眼或需角膜移植手术，延长停工留薪期。
虹膜睫状体损伤 外伤性散瞳	3—6个月	瞳孔复原，或无法治疗复原。	合并角膜血染或继发青光眼者，延长停工留薪期。
前房出血	1—3个月	出血吸收。	继发青光眼者，延长停工留薪期。
虹膜根部离断	1—3个月	出血吸收。	继发青光眼者，延长停工留薪期。
外伤性虹膜睫状体炎	1—3个月	炎症消退或被控制。	需二次手术者，延长停工留薪期。
晶体损伤 晶体脱位、晶体混浊	6—12个月	刺激症状消失。	玻璃体混浊，延长停工留薪期。
玻璃体损伤 玻璃体出血、玻璃体混浊	6—12个月	出血、混浊吸收或不能吸收，但已控制。	按视网膜病变程度及治疗效果确定期限。 需二次手术者，延长停工留薪期。
网膜脉络膜损伤 视网膜震荡、视网膜出血 视网膜脱离	2—12个月 3—12个月	出血、渗出吸收或机化。 网膜复位，如不能治疗复位，而炎症反应或刺激症状消失或已被控制。	需手术者，延长停工留薪期。
网膜脉络膜损伤 黄斑穿孔，网膜、脉络膜破裂	3—12个月	病灶机化或静止。	需二次成形手术延长停工留薪期。

视神经损伤 视神经撕脱、视神经鞘内出血、视神经萎缩	6—12个月	临床症状静止，受控制。	
外伤性眼球摘除术后	3—6个月	创口愈合。	
外伤性眼球内容挖除术后			
交感性眼炎	6—12个月	炎症消退。	炎症复发延长停工留薪期。
电光性眼炎	1—2周	症状消退。	
放射性眼外伤	6—12个月	症状消退。	

耳 鼻 喉 科

外伤性疾病名称	停工留薪期	医疗终结评定依据	备注
鼻部损伤 外鼻挫伤、鼻软组织损伤、鼻骨骨折（开放、闭合）、鼻窦损伤	2—4个月	1、创口愈合，骨折愈合，肿胀消失，鼻腔基本通畅。 2、鼻部轻度变形。 3、嗅觉减退或丧失。	需整形再延长2-4个月。
咽喉气管食管损伤 咽、喉、气管损伤	3—12个月	1、吞咽、发声、呼吸基本恢复正常。 2、遗有喉轻度狭窄，声带轻度麻痹。	视损伤程度确认期限需二次手术延长停工留薪期。
食管化学伤	6—12个月	1、固体饮食顺利通过， 2、轻度咽食困难，半流质食物能顺利通过， 3、中度咽食困难，流质食物才能通过。	需再次治疗延长停工留薪期。
耳部损伤 耳廓开放性损伤	1-3个月	创口愈合。	整形延长停工留薪期至6个月。
外耳道损伤	1-3个月	1、外耳道基体畅通。 2、外耳道部分狭窄，但不影响听力。	需二次手术延长停工留薪期。
单纯性鼓膜穿孔（单侧、双侧）	1—3个月	中耳无分泌物，鼓膜形成疤痕。	
耳部损伤 鼓膜穿孔（单、双侧） 所有听骨链损伤）	3—6个月	1、鼓膜形成疤痕，听力接近正常。 2、鼓膜穿孔，鼓室少量	按听力损伤程度适当调整

内耳损伤、颞骨骨折	6—8个月	分泌物,听力(500、1000、2000赫)在30—40分贝。 3、鼓膜未愈合,听力(500、1000、2000赫)在30—40分贝。 1、骨折愈合,保持部分听力(500、1000、2000赫)在30—40分贝。 2、听力障碍(500、1000、2000赫)在41—60分贝。	
急性声损伤(包括爆炸、火器或其它突发性巨响引起耳聋)	3—6个月	1、听力恢复在30分贝以内。 2、听力损失在30—40分贝。 3、听力损失在40—60分贝。 4、>60分贝。	

口 腔 科

外伤性疾病名称	停工留薪期	医疗终结评定依据	备 注
颌面部软组织损伤	1—3个月	创口愈合,肿胀消退。	引起明显畸形及功能障碍需进一步治疗者,延长停工留薪期。
颌骨骨折或颧骨骨折	3个月	骨折愈合。	同上
牙外伤,齿槽骨骨折	3个月	伤口及骨折愈合。	同上
颌面部软组织及颌骨外伤缺损	3个月	伤口愈合。	同上
一侧上颌骨或一侧下颌骨切除	3—6个月	伤口愈合。	有严重功能障碍需综合治疗者,延长停工留薪期。

(二) 职业 病

职业中毒疾病	停工留薪期	医疗终结评定依据	备 注
矽肺病	10—12个月		适用首次确认。旧伤复发需要治疗的,根据伤情和医疗需要确定。
慢性铅中毒 轻度	3—6个月	尿铅量、尿粪卟啉或0—一氨基乙酰丙酸、血液点	驱铅治疗后一般不必调离原工作。

中度	6—12个月	彩红细胞或碱粒细胞恢复正常。 除上项外,腹绞痛、贫血、感觉型多发性神经炎或伸肌功能基本稳定。	驱铅治疗后原则上调出铅作业,安排其它适当工作。
重度	1—2年	除上二项外,铅麻痹或铅中毒性脑病症状体征稳定。	必须调离铅作业,酌情安排其它轻工作。如遗有严重神经系统症状体征,延长停工留薪期。
急性汞中毒	4—6个月	震颤、肝肾损害。“汞中毒性皮炎”尿汞量均恢复正常。	驱汞治疗恢复原工作或另行安排其它适当工作。
慢性汞中毒 轻度	3—6个月	震颤、尿汞量恢复正常,汞性口腔炎或牙龈炎消失。	驱汞治疗后原则上不必调出原作业。
中度	6—12个月	同上。	驱汞治疗后调出汞作业,安排其它适当工作。
重度	1—2年	除上项外,汞中毒性脑病症状体征稳定。	必须调离汞工作,酌情安排其他工作。如遗有严重神经系统症状体征,延长停工留薪期。
急性苯中毒 轻度	2周一3个月	急性中毒症状消失,无阳性体征。	治疗后恢复原工作。
重度	1—2年	同上。	治疗后调离苯作业,酌情安排其他适当工作。
慢性苯中毒 轻度	6个月—1年	白细胞计数恢复正常。	治疗后尽可能调出苯作业,连续三个月检查白细胞数恢复到4500平方毫米以上者,可安排适当工作。
中度	8个月—1年	白细胞、血小板计数恢复正常。	调离原作业,另行安排适当工作。
重度	1—2年	除上项外,骨髓造血功能稳定。	治愈者亦不宜从事接触苯及其同系化合物的毒物工作,酌情安排其他轻工作。如遗有造血功能严重损害,延长停工留薪期。

慢性三硝基甲苯中毒	轻度	6个月—1年	肝、肾、造血及视功能基本稳定。	治疗后调离原作业，安排适当工作。	
	重度	1—2年	同上。	调离原作业，病情恢复者酌情安排其它轻工作。如仍遗有严重肝、肾、造血及视功能障碍者，延长停工留薪期。	
急性苯的氨基、硝基化合物中毒	轻度	1—3个月	急性中毒症状、血液高铁血红蛋白、变性珠蛋白小体、网织红细胞恢复正常。除上项外，肝损害恢复正常。	治疗后恢复原工作。	
	中度	3—6个月	除上项外，肝肾功能稳定。	治疗后调离原作业，安排适当工作。	
	重度	1—2年			治疗后遗有肝、肾损害者应调离原作业，延长停工留薪期。
不包括三硝基甲苯慢性	轻度	6个月—1年	肝损害、贫血、变性珠蛋白小体、网织红细胞恢复正常。	治疗后根据病情和劳动条件等具体情况决定是否调离原作业。	
	重度	1—2年	肝、肾、造血功能稳定。	治疗如遗有严重肝、肾、造血功能障碍者应调离原作业，酌情安排其它工作，延长停工留薪期。	
急性有机磷农药中毒	轻度	1—2个月	急性中毒症状及全血胆碱酯酶活性恢复正常。	三个月内不宜再接触有机磷，有痕迹反应应调离原工种。	
	中度	1—3个月	同上。	同上。	
	重度	3—12个月	除上项外，迟发性神经毒性症状体征稳定。	不能再接触有机磷农药，安排其他适当工作。如遗有多发性神经炎，延长停工留薪期。	
慢性有机磷农药中毒	轻度	2—3个月	慢性中毒症状、体征及全血胆碱酯酶活性恢复正常。	应脱离接触，进行治疗。	
	中度	3—6个月	同上。	治疗后调离原作业，安排适当工作。	

重度	6—12个月	同上。	同上。
急性一氧化碳中毒			
轻度	1—2个月	症状、体征稳定。	如遇有痕迹反应者，应调离，不宜再接触一氧化碳作业，酌情安排其它轻工作。如遗有严重神经系统损害的症状体征，延长停工留薪期。
中度	1—3个月		
重度	1—18个月		
慢性锰中毒			
轻度	6—12个月	震颤消失，肌张力恢复正常，尿锰量在正常范围。	不得继续从事锰作业，治愈后可安排其它工作。
重度	1—2年	鉴于锰中毒是损害椎体外系为主的疾病，严重时出现帕金森氏综合症和中毒性精神病，按目前的治疗手段，一般可减轻或改善症状，但难于估计治愈时间，故医疗终结时间及标准从略。	调离原作业需长期休息。
急性镉中毒			
轻度	1—2个月	急性中毒症状，无阳性体征。	治疗后恢复原作业。
重度	2—6个月	同上。	治疗后根据病情和劳动条件而定是否调离原作业。如有器质性损害延长停工留薪期。
慢性镉中毒			
轻度	6—12个月	症状消失，尿蛋白化验正常。	1、应调离原工作及有害作业， 2、可从事其它工作。
重度	1—2年	病情稳定，肾功能检验正常。	1、应调离原工作及有害作业。 2、根据病情安排适当休息或全休。
急性铍中毒			
轻度	1—2个月	症状消失无阳性体征。	治愈后，原则上不再从事铍作业。每半年胸部X线检查一次，连续2年无变化，可按一般铍作业人员要求安排工作，并定期健康检查。
重度	2—6个月	同上。	同上。

慢性铍中毒 轻度 重度	1—3个月 6—12个月	症状消失，无阳性体征。 治疗后病情稳定作为一个疗程（6—12个月）。	恢复原作业。 应调离铍作业及其他粉尘作业，按病情安排工作或休息，或反复几个疗程进行治疗。
急性钒中毒 刺激反应 轻度 重度	5—7天 15天—1个月 2—6个月	症状消失。 症状消失，无阳性体征同上。	恢复原作业。 治愈后恢复原作业。 同上，如急性中毒致慢性支气管炎者，调离原工作并给予治疗。
急性砷化氢中毒 轻度 重度	1—2个月 2—6个月	症状消失，无阳性体征， 检验正常。 病情稳定，化验恢复正常。	病情恢复后，可从事原作业。 需调离有害作业并根据健康恢复情况安排轻工作或休息。
急性氯气中毒 刺激反应 轻度 中度 重度	3—7天 15天—1个月 1—2个月 2—6个月	症状消失。 症状体征消失。 同上 同上。	恢复原作业。 同上。 1、中、重度中毒时， 治疗后如有明显的呼吸道症状，结合胸部X线及肺功能测定延长停工留薪期。 2、本规定也适用于其他刺激性气体急性中毒治疗后的处理。
急性二硫化碳中毒 轻度 重度	1—2个月 2—6个月	症状体征消失。 同上。	可恢复原作业并定期复查。 调离二硫化碳作业，定期复查，如遗有严重的神经系统损伤，延长停工留薪期。
慢性二硫化碳中毒 轻度 重度	6—12个月 1—2年	治疗后症状体征消失或 稳定。 症状消失，体征稳定。	暂时调离二硫化碳作业，根据病情适当安排轻工作和休息。 应长期调离二硫化碳作业和休息。如遗有严

			重神经损害和症状体征，延长停工留薪期。
急性磷化氢中毒			
轻度	15天—1个月	症状体征消失，检验恢复正常。	可恢复原工作。
重度	2—6个月	同上或稳定。	治愈调离原工作，如遗留症状酌情延长停工留薪期。
工业氟病			
I期	1—3个月	症状体征稳定	可恢复原工作，定期复查。
II期	3—6个月	同上	调离原作业，根据病情安排适当工作，定期复查。
III期	6—12个月	同上	同上或休息。
急性四乙基铅中毒			
观察对象	7—15天	症状消失。	恢复原工作。
轻度	1—3个月	症状体征恢复正常。	调离原工作。
重度	3—6个月	同上	调离原作业，如遗有明显症状，延长停工留薪期。
急性三烷基锡中毒			
观察对象	7—15天	症状消失。	恢复原作业
轻度	15天—1个月	症状体征消失。	调离原作业
中度	1—2个月	同上。	同上，安排其他工作。
重度	3—6个月	同上。	调离原作业，不再接触有毒作业，视病情而定延长停工留薪期。
急性羰基镍中毒			
轻度	15天—1个月	症状体征消失。	可恢复原作业。
中度	1—3个月	同上。	治疗后仍有明显症状可酌情延长停工留期，并调离原作。
重度	3—6个月	同上。	同上或安排疗养。
急性甲苯、二甲苯中毒			
轻度	7—15天	症状体征消失。	可恢复原作业。
重度	2—6个月	症状体征消失。	治愈后可恢复原工作。
急性溶剂汽油中毒			
吸入性肺炎	15天—1个月	症状体征消失，白细胞正常。	恢复原工作。

轻度	1—3个月	同上。	治愈后，可恢复原工作。
重度	3—6个月	同上。	治愈后，调离汽油作业。
慢性溶剂汽油中毒			
轻度	1—3个月	症状体征和神经系统检查恢复正常。	治疗后，应调离汽油作业，定期复查，并根据病情安排适当工作或休息。如遗留明显体征及神经系统检查未恢复者可延长停工留薪期。
中度	3—6个月	同上。	同上。
重度	1—2年	同上。	同上。
急性有机氟聚合物单体和热裂解物中毒			
轻度	1—2个月	症状消失，胸部X线复查恢复正常。	可恢复原工作。
中度	1—3个月	同上。	治疗后，经短期疗养，恢复原工作。
重度	2—6个月	同上。	治疗后，如遗留有肺、心、肾等功能损害者，应调离原作业并定期复查，必要时延长停工留薪期。
急性二氯乙烷中毒			
轻度	1—2个月	症状体征消失、化验、检查恢复正常。	治愈后，可恢复原工作。
重度	2—6个月	同上。	调离原工作酌情安排轻工作，或休息或延长停工留薪期。
急性四氯化碳中毒			
轻度	1—2个月	症状体征消失，肝、肾功能恢复正常。	治愈后，可恢复原工作。
重度	6—12个月	同上。	治愈后，调离有害作业，如遗留肝、肾功能未恢复，延长停工留薪期或休息。
急性三氯乙烯中毒			
轻度	15天—1个月	治疗后症状体征消失。	治愈后，可恢复原工作。
重度	3—6个月	症状体征消失，肝、心、肾功能恢复正常。	治疗后，调离原工作，如遗留肝、心、肾功能未恢复者延长停工留薪

			期或休息。
慢性氯丙烯中毒			
轻度	1—6个月	治疗后，症状体征消失。	治疗后，调离原工作，并定期复查。
重度	1—2年	同上。	同上，如遗留神经系统损害未恢复，可延长停工留薪期或疗养，并定期复查。
急性氯丁二烯中毒			
轻度	1—2个月	治疗后症状体征消失。	治愈后，可恢复原作业。
重度	2—6个月	同上，肝功能恢复正常。	治愈后，无肝损害，可恢复原工作，定期复查。如有肝损害应延长停工留薪期。
慢性氯丁二烯中毒			
轻度	1—3个月	症状消失无阳性体征，各种检查恢复正常。	治愈后，可恢复原工作。如肝损害有II度质度改变者，应调离原作业，每3—6个月复查一次。
重度	6—12个月	同上，如有肝硬化，经治疗后，病情稳定。	治疗后，调离原作业，视病情安排半休或从事轻工作，或全休。如肝功未恢复，延长停工留薪期。
急性丙烯腈中毒			
轻度	1—2个月	症状体征消退，尿硫氰酸盐正常，血清谷丙转氨酶恢复正常。	三个月内不宜再接触丙烯腈。
重度	3—12个月	神经系统症状体征恢复正常。	调离原作业，若神经系统症状尚未恢复正常，可延长停工留薪期。
急性拟除虫菊酯中毒			
轻度	1—2周	全身症状消退。	治愈后，可恢复原工作。
重度	3—12个月	症状、体征消退。	调离原作业。
急性溴甲烷中毒			
轻度	1—2个月	症状消退。	治愈后可从事原工作。
重度	6—12个月	症状、体征消退，肾功能正常。	调离原作业，少数留有神经功能恢复不全者，或延长停工留薪期。

急性杀虫眯中毒 轻度 中度 重度	1—2周	症状消退。	治愈后可从事原工作。
	1—3个月	症状消退,血高铁血红蛋白量降到正常。血尿阴性。	治愈后可从事原工作。
	3—12个月	症状、体征稳定。	调离原作业。
急性五氯酚中毒 轻度 重度	1—2个月	症状消退,尿检恢复正常。	治愈后可恢复原作业。
	3—12个月	症状消失,各种检查恢复正常。	调离原作业,安排其他工作。
硫酸二甲酯中毒、甲醛中毒、氨中毒、光气中毒、氮氟化物中毒等刺激性气体			参照氯气中毒处理原则。
硫化氢中毒、氰化物中毒等窒息性气体 急性一氧化碳中毒 轻度 中度 重度	1—2个月	症状、体征稳定。	参照一氧化碳中毒处理原则。
	1—3个月	同上	不宜再接触一氧化碳作业。
	8—12个月	同上,并无后遗症。	酌情安排其他轻工作,如遗有严重神经系统损害的症状、体征,延长停工留薪期。 同上。

说明:在本专业未列出,又由职业性引起的疾病,例如,职业性难听,电光性眼炎,化学性灼伤,职业性皮肤病(包括过敏性皮炎,接触性皮炎,化学性皮炎)等,可参照本标准内有关专科所规定的条件对照执行